

Χρονομετρημένη Παρατήρηση Ανθέων-Εντόμων: Οδηγός ως προς τα άνθη στόχους

Ο οδηγός αυτός έχει τύχει προσαρμογής από το [Πρόγραμμα Καταγραφής Επικονιαστών του ΗΒ](#) (Pollinator Monitoring Scheme, PoMS) για να υποστηρίξει τη μελέτη των εντόμων επικονιαστών στην Κύπρο και τις χρονομετρημένες παρατηρήσεις (Flower-Insect Timed Count, FIT Count). Το πρόγραμμα επιστήμης-πολιτών «Επικονοιαζόμαστε» πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ερευνητικού προγράμματος Εισβλητικών Ειδών στην Κύπρο (Researching Invasive Species in Κύπρος, www.ris-ky.info), του UK Centre for Ecology and Hydrology (UKCEH), του Joint Services Health Unit (JSHU), British Forces Cyprus, με τη στήριξη του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου (AEEC) και χρηματοδότηση του προγράμματος Darwin.

Το κείμενο συντάχθηκε από τα συγγράμματα: *Δέντρα και Θάμνοι στην Κύπρο* των Τάκη Χ. Τσιντίδη, Γεώργιου Ν. Χατζηκυριάκου και Χαράλαμπου Σ. Χριστοδούλου 2002. Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης – Φιλοδασικός Σύνδεσμος και *Flora of Cyprus* του R.D. Meikle 1985 2nd volume. The Bentham-Moxon Trust, Royal Botanic Gardens, Kew.

Άνθη Στόχοι

Χρονομετρημένη Παρατήρηση Ανθέων-Εντόμων:	1
Οδηγός ως προς τα άνθη στόχους	1
Άνθη Στόχοι	Error! Bookmark not defined.
Εισαγωγή	3
Από τον Γενάρη και μετά	4
Χρυσάνθεμο, Chrysanthemum, <i>Glebionis coronarium</i>	4
Φραμός Αρκοτομαθκιά, African Boxthorn, <i>Lycium ferocissimum</i> (Ξενικό)	5
Γιατρός, Tree Tobacco, <i>Nicotiana glauca</i> (Ξενικό)	6
Μερτζανιά, Common Winter-Cherry, <i>Withania somnifera</i> (Ξενικό)	7
Ξισταριές, Rock-roses, <i>Cistus spp.</i>	8
Ανεμώνη, Anemone, <i>Anemone coronaria</i>	9
Δωδόνεια, Hopseed-Bush, <i>Dodonaea viscosa</i> (Ξενικό)	10
Ασπάλαθος, Spiny Broom, <i>Calicotome villosa</i>	11
Από τον Φεβρουάριο και μετά	12
Κίτρινο γιασεμί, Primrose Jasmine, <i>Jasminum mesnyi</i> (Ξενικό)	12
Λαντάνα η καμάρα, Common Lantana, <i>Lantana camara</i> (Ξενικό)	13
Ακακία, Acacia, <i>Acacia saligna</i> (Ξενικό)	14
Λαψάνα, White Mustard, <i>Sinapis alba</i>	15
Παπαρούνες, Poppies, <i>Papaver spp.</i>	16
Μυοπόρο, Waterbush <i>Myoporum tenuifolium</i> (Ξενικό)	17
Από τον Μάρτιο και μετά	18
Χωνάκι, Bindweed, <i>Convolvulus spp.</i>	18

Δέντρο του Ιούδα, Judas Tree, <i>Cercis siliquastrum</i> (Ξενικό)	19
Λεβάντα, Lavender, <i>Lavandula stoechas</i>	20
Παθκιά του καμήλου, Μποχίνια, Camel's Foot, <i>Bauhinia variegata</i> (Ξενικό)	21
Καλλιστήμων ο λογχοειδής, Bottlebrush, <i>Callistemon lanceolatus</i> (Ξενικό)	22
Από τον Απρίλιο και μετά	23
Ηλιοτρόπιο, Heliotropes, <i>Heliotropium spp.</i>	24
Ρολογάκι, Common Passion Flower, <i>Passiflora caerulea</i> (Ξενικό)	25
Αναθρήκα, Fennel, <i>Foeniculum vulgare</i>	26
Μερσινιά, Myrtle, <i>Myrtus communis</i>	27
Ελιά, Olive, <i>Olea europaea</i>	28
Γρεβιλλέα η ισχυρή, Silky Oak, <i>Grevillea robusta</i> (Ξενικό)	29
Τζιακαράντα, Sharpleaf Jacaranda, <i>Jacaranda mimosifolia</i> (Ξενικό)	30
Από τον Μάιο και μετά	31
Πλουμπάγο η ωτοειδής, Blue Plumbago, <i>Plumbago auriculata</i> (Ξενικό)	31
Αλμπίτσια, Silk Tree, <i>Albizia julibrissin</i>	32
Από τον Ιούνιο και μετά	33
Γιασεμί το μεγανθές, Spanish Jasmine, <i>Jasminum grandiflorum</i> (Ξενικό)	33
Βουκεμβίλια, Γιαννής, Lesser Bougainvillea, <i>Bougainvillea glabra</i>	34
Από τον Ιούλιο και μετά	35
Παρκινσόνια, Jerusalem Thorn, <i>Parkinsonia aculeata</i> (Ξενικό)	35
Από τον Οκτώβριο και μετά	36
Βιγνόνια, Yellow Elder, <i>Tecoma stans</i> (Ξενικό)	36
Από τον Νοέμβριο και μετά	37
Ξινάκι, Bermuda buttercup, <i>Oxalis pes-caprae</i> (Ξενικό)	37
Εναλλακτικές επιλογές ανθέων κατάλληλα για τις παρατηρήσεις σας	38
Ευρετήριο Ανθέων Στόχων- Index of Target Flowers	40

Ευχαριστίες

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Ιωάννα Αγγελίδου Joint Services Health Unit, τον κύριο Παντελή Χαριλάου, SBAs, για τη συλλογή και συγγραφή των πληροφοριών που περιέχει ο οδηγός των ανθέων στόχων, την κυρία Έλλη Τζιρκαλή Υποψήφια Διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και την κυρία Άντρη Βαρνάβα, Υποψήφια διδάκτορα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τις προτάσεις τους ως προς τα είδη που θα συμπεριληφθούν και τον κύριο Μάριο Φιλίππου, Joint Services Health Unit για τις υπέροχες φωτογραφίες.

Θερμές ευχαριστίες στον Δρ. Ιωάννη Μπαζό, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη βοήθεια του με τη σύνταξη, μετάφραση κι επιμέλεια του ελληνικού κειμένου.

Εισαγωγή

Ο οδηγός με τα άνθη-στόχους θα σας καθοδηγήσει κατά τη χρονομετρημένη παρατήρηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Καταγραφής Επικονιαστών Κύπρου (Επικονοιαζόμαστε). Κατά τη διάρκεια της παρατήρησης, θα θέλαμε, αν είναι δυνατόν, να επικεντρώνεστε σε ένα από τα άνθη-στόχους, καθώς αυτό θα μας επιτρέψει την ακριβή και συγκρίσιμη στον χώρο και τον χρόνο συλλογή δεδομένων. Αν δεν μπορείτε να βρείτε οποιοδήποτε από τα άνθη-στόχους του οδηγού στην περιοχή σας, μπορείτε να διαλέξετε ένα άλλο ανθοφόρο φυτό για την παρατήρηση σας. Στο τέλος του οδηγού αυτού, θα βρείτε έναν κατάλογο με εναλλακτικές επιλογές ανθέων. Καθώς το πρόγραμμα RIS-Κύ ερευνά την παρουσία ξενικών εισβλητικών ειδών, έχουμε συμπεριλάβει στον κατάλογο και φυτικά είδη που είναι ξενικά στην Κύπρο διότι μας ενδιαφέρει πολύ να μάθουμε ποια είδη επικονιαστών επισκέπτονται τα φυτά αυτά.

Κάθε άνθος-στόχος εμφανίζεται χρονολογικά με βάση τον μήνα κατά τον οποίο συνήθως ανθίζει. Μπορείτε ωστόσο να χρησιμοποιήσετε στην καταμέτρησή σας τα είδη-στόχους, οποιαδήποτε στιγμή τα συναντήσετε να ανθίζουν, χωρίς να χρειάζεται να παραμείνετε πιστοί στους προτεινόμενους μήνες. Ο οδηγός περιέχει πληροφορίες για το πού θα συναντήσετε το κάθε φυτό, απαραίτητες συμβουλές για την ταυτοποίησή του και οδηγίες για τη χρονομετρημένη παρατήρηση.

Υπόβαθρο του προγράμματος

Η Χρονομετρημένη Καταγραφή Εντόμων Ανθέων είναι μέρος του Προγράμματος Παρακολούθησης Επικονιαστών Κύπρου (Επικονοιαζόμαστε ή PoMS-Κύ) κι αναπτύχθηκε από τον Συνεταιρισμό για την Έρευνα και Παρακολούθηση Επικονιαστών του HB και του Joint Services Health Unit, British Forces Cyprus ως μέρος του διετούς προγράμματος RIS-Κύ (www.ris-ky.info) που χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Darwin του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων του HB (Defra). Το «Επικονοιαζόμαστε» εμπνέεται από το πρόγραμμα PoMS του Συνεταιρισμού για την Έρευνα και Παρακολούθηση Επικονιαστών του HB, που συντονίζεται από το Κέντρο Οικολογίας & Υδρολογίας του HB (CEH). Το PoMS συγχρηματοδοτείται από το Defra, τις κυβερνήσεις της Ουαλίας και Σκωτίας, τον Σύμβουλο της Κυβέρνησης HB για τη Διατήρηση της Φύσης (JNCC) και τους εταίρους του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του CEH, του Bumblebee Conservation Trust, Butterfly Conservation, British Trust for Ornithology, Hymettus, το Πανεπιστήμιο του Reading και το Πανεπιστήμιο του Leeds. Το PoMS στοχεύει να παρέχει τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάσταση των επικονιαστών εντόμων του HB, ειδικότερα τις άγριες μέλισσες και τον ρόλο που διαδραματίζουν στη στήριξη της γεωργίας και της άγριας ζωής. Το PoMS περιλαμβάνει διαφορετικές προσεγγίσεις στην παρακολούθηση επικονιαστών, συμπεριλαμβανομένης της χρονομετρημένης καταγραφής, καθώς και μία συστηματική έρευνα επικονιαστών κι ανθοφόρων φυτών σε ένα δίκτυο περιοχών στην Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία. Όπου είναι δυνατόν, έχουμε χρησιμοποιήσει λουλούδια του ίδιου γένους ή λουλούδια που σχετίζονται στενά με είδη που επιλέγηκαν στο PoMS για να διασφαλίσουμε συνέπεια μεταξύ των συστημάτων καταγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες για το PoMS HB επισκεφθείτε το: www.ceh.ac.uk/pollinator-monitoring



Πρόγραμμα Defra BE0125/ NEC06214: Εγκαθιστώντας έναν Συνεταιρισμό Παρακολούθησης και Έρευνας Επικονιαστών στο HB
Έκδοση εγγράφου 3.0, Φεβρουάριος 2018

Από τον Γενάρη και μετά

Χρυσάνθεμο, *Chrysanthemum*, *Glebionis coronarium*

Ιαν.	Φεβρ.	Μαρ.	Απρ.	Μάιος	Ιούν.	Ιούλ.	Αύγ.	Σεπτ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.
------	-------	------	------	-------	-------	-------	------	-------	------	------	------



Το Χρυσάνθεμο βρίσκεται σε αφθονία σε παρυφές δρόμων, σε χωράφια και σε αδόμητη αστική γη.
Η καταμέτρηση πρέπει να βασίζεται στον αριθμό των κεφαλίων (όπως φαίνεται και στον κύκλο πιο πάνω)
Φραμός Αρκοτομαθικιά, African Boxthorn, *Lycium ferocissimum* (Ξενικό)

Ιαν.	Φεβρ.	Μάρ	Απρ.	Μάιος	Ιούν.	Ιούλ.	Αύγ.	Σεπτ.	Οκτ.	Νοέ.	Δεκ.
------	-------	-----	------	-------	-------	-------	------	-------	------	------	------



Εγκλιματισμένο ξενικό είδος στην Κύπρο, ιθαγενές της Νοτίου Αφρικής. Φυτεύεται ως φράκτης και ανεμοφράκτης (φραμός).

Οι καταμετρήσεις των ανθέων πρέπει να βασίζονται στον αριθμό των μεμονωμένων ανθέων (όπως φαίνεται στον άσπρο κύκλο στις πιο πάνω φωτογραφίες). Όπου αναπτύσσεται ως ψηλός θάμνος, το τετράγωνο 50cm x 50cm μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα ή σε βολική γωνία στον θάμνο, αρκεί να καθορίζει σαφώς την περιοχή των ανθέων που θα χρησιμοποιήσετε για την καταμέτρησή σας.

Γιατρός, Tree Tobacco, *Nicotiana glauca* (Ξενικό)

Ιαν.	Φεβ.	Μάρ.	Απρ.	Μάιος	Ιούν.	Ιουλ.	Αύγ.	Σεπτ.	Οκτ.	Νοέμβρ.	Δεκ.
------	------	------	------	-------	-------	-------	------	-------	------	---------	------



Ένα διαδεδομένο, ξενικό είδος στην Κύπρο που έχει εγκλιματιστεί σε άκρες δρόμων και αδόμητο έδαφος. Ιθαγενές της Νοτίου Αμερικής.

Οι καταμετρήσεις των ανθέων πρέπει να βασίζονται στον αριθμό των μεμονωμένων ανθέων (όπως φαίνεται στον άσπρο κύκλο στις πιο πάνω φωτογραφίες). Όπου αναπτύσσεται ως ψηλός θάμνος, το τετράγωνο 50cm x 50cm μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα ή σε βολική γωνία στον θάμνο, αρκεί να καθορίζει σαφώς την περιοχή των ανθέων που θα χρησιμοποιήσετε για την καταμέτρησή σας.

Μερτζανιά, Common Winter-Cherry, *Withania somnifera* (Ξενικό)

Ιαν.	Φεβρ.	Μάρ.	Απρ.	Μάιος	Ιούν.	Ιούλ.	Αύγ.	Σεπτ .	Οκτ.	Νοέμβρ.	Δεκ.
------	-------	------	------	-------	-------	-------	------	--------	------	---------	------



Ξενικό είδος για την Κύπρο.

Οι καταμετρήσεις πρέπει να βασίζονται στον αριθμό των μεμονωμένων ανθέων (όπως φαίνεται στον άσπρο κύκλο στις πιο πάνω φωτογραφίες). Όπου αναπτύσσεται ως ψηλός θάμνος, το τετράγωνο 50cm x 50cm μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα ή σε βολική γωνία στον θάμνο, αρκεί να καθορίζει σαφώς την περιοχή των ανθέων που θα χρησιμοποιήσετε για την καταμέτρησή σας.

Ξισταριές, Rock-roses, *Cistus* spp.

Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος
------------	-------------	---------	----------	-------	---------



Ευδιάκριτοι ιθαγενείς θάμνοι φρυγάνων.

Υπάρχουν διάφορα είδη ξισταριών στην Κύπρο και δεν είναι αναγκαίο να διαχωρίζετε τα είδη για την καταμέτρηση. Ωστόσο, αν γνωρίζετε σε ποιο είδος πραγματοποιήσατε την παρατήρηση, παρακαλούμε να προσθέσετε τις πληροφορίες αυτές στο έντυπο καταγραφής.

Οι καταμετρήσεις ανθέων πρέπει να βασίζονται στον αριθμό των μεμονωμένων ανθέων (όπως φαίνεται στον άσπρο κύκλο στις πιο πάνω φωτογραφίες).

Ανεμώνη, *Anemone*, *Anemone coronaria*

Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος
------------	-------------	---------	----------



Οι ανεμώνες είναι ιθαγενή φυτά της Κύπρου και εντοπίζονται σε χλωώδεις πλαγιές, λιβάδια, σε άκρες δρόμων και σε ξηρό θαμνώδες έδαφος.

Οι καταμετρήσεις ανθέων πρέπει να βασίζονται στον αριθμό των μεμονωμένων ανθέων (όπως φαίνεται στον άσπρο κύκλο στις πιο πάνω φωτογραφίες).

Δωδόνεια, Hopseed-Bush, *Dodonaea viscosa* (Ξενικό)

Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος
------------	-------------	---------	----------



Ξενική στην Κύπρο. Ιθαγενής σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές, π.χ. στην Αυστραλία. Συναντάται σε φραμούς, στις άκρες χωραφιών, στις άκρες των δρόμων και μερικές φορές σε θαμνώδεις περιοχές. Φυτεύεται ευρέως σε φράκτες και ανεμοφράκτες. Τα άνθη είναι κιτρινοπράσινα ή με ιώδεις ραβδώσεις.

Οι καταμετρήσεις των ανθέων πρέπει να βασίζονται στον αριθμό των μεμονωμένων ανθέων (όπως φαίνεται στον άσπρο κύκλο στις πιο πάνω φωτογραφίες). Όπου αναπτύσσεται ως ψηλός θάμνος, το τετράγωνο 50cm x 50cm μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα ή σε βολική γωνία στον θάμνο, αρκεί να καθορίζει σαφώς την περιοχή των ανθέων που θα χρησιμοποιήσετε για την καταμέτρησή σας.

Ασπάλαθος, Spiny Broom, *Calicotome villosa*

Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος
------------	-------------	---------	----------	-------



Ο ασπάλαθος είναι ιθαγενής θάμνος μετρίου ή μεγάλου ύψους (μέχρι 3m), που βρίσκεται σε ξηρές βουνοπλαγιές, φρύγανα ή θαμνώνες αείφυλλων σκληρόφυλλων.

Οι καταμετρήσεις των ανθέων πρέπει να βασίζονται στον αριθμό των ανθέων (όπως φαίνεται στον άσπρο κύκλο στην πιο πάνω φωτογραφία). Όπου αναπτύσσεται ως ψηλός θάμνος ή με τη μορφή φυτοφράκτη, το τετράγωνο 50cm x 50cm μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα ή σε βολική γωνία στον θάμνο, αρκεί να καθορίζει σαφώς την περιοχή των ανθέων που θα χρησιμοποιήσετε για την καταμέτρησή σας.

Από τον Φεβρουάριο και μετά

Κίτρινο γιασεμί, Primrose Jasmine, *Jasminum mesnyi* (Ξενικό)

Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος
-------------	---------	----------	-------	---------	---------	-----------	-------------



Ιθαγενές της δυτικής Κίνας, καλλιεργείται συχνά σε κήπους και πάρκα. Μπορεί να αναπτυχθεί γρήγορα σε πολύ πυκνό φυτοφράκτη, ενώ χρησιμοποιείται για να καλύψει τοίχους λόγω των κρεμαστών κλαδιών του.

Οι καταμετρήσεις των ανθέων πρέπει να βασίζονται στον αριθμό μεμονωμένων ανθέων (όπως φαίνεται στον άσπρο κύκλο στις πιο πάνω φωτογραφίες).

Λαντάνη η καμάρα, Common Lantana, *Lantana camara* (Ξενικό)

Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος
-------------	---------	----------	-------	---------	---------	-----------	-------------



Ξενικό είδος στην Κύπρο που συναντάται συχνά σε κήπους. Διαφεύγει από κήπους και αυτοφύεται. Ιθαγενές της τροπικής Αμερικής. Φυτεύεται για τα ελκυστικά του άνθη και τη μακρά περίοδο ανθοφορίας. Κατάλληλο ως φυτοφράχτης και καλλωπιστικό.

Οι καταμετρήσεις των ανθέων πρέπει να βασίζονται στον αριθμό των ταξιανθιών (όπως φαίνεται στον άσπρο κύκλο στις πιο πάνω φωτογραφίες).

Ακακία, *Acacia*, *Acacia saligna* (Ξενικό)

Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος
-------------	---------	----------	-------



Ιθαγενής της Αυστραλίας, αυτός ο μεγάλος και απλωτός θάμνος (φτάνει έως 5m πλάτος), συναντάται συχνά σε άκρες δρόμων, σε αδόμητη αστική γη, ανώμαλο έδαφος και, μερικές φορές, σε κήπους. Τα σφαιρικά άνθη είναι πολύ χαρακτηριστικά.

Οι καταμετρήσεις των ανθέων πρέπει να βασίζονται στον υπολογισμό του αριθμού μεμονωμένων ανθέων (όπως φαίνεται από τον κύκλο στη φωτογραφία πιο πάνω δεξιά). Όπου αναπτύσσεται ως ψηλός θάμνος, το τετράγωνο 50cm x 50cm μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα ή σε βολική γωνία στον θάμνο, αρκεί να καθορίζει σαφώς την περιοχή των ανθέων που θα χρησιμοποιήσετε για την καταμέτρησή σας.

Λαψάνα, White Mustard, *Sinapis alba*

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος





Ιθαγενές. Πολύ χαρακτηριστικά είναι τα κίτρινα λιβάδια με λαψάνες που αναπτύσσονται συνήθως σε αδόμητη και καλλιεργούμενη γη και σε άκρες δρόμων.

Οι καταμετρήσεις των ανθέων πρέπει να βασίζονται στον υπολογισμό του αριθμού μεμονωμένων ανθέων (όπως φαίνεται στον κύκλο την πιο πάνω φωτογραφία κάτω δεξιά)

Παπαρούνες, Poppies, *Papaver* spp.

Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος
-------------	---------	----------	-------	---------





Οι παπαρούνες φύονται συνήθως σε αδόμητη γη και σε άκρες λιβαδιών και δρόμων.

Υπάρχουν διάφορα ιθαγενή είδη του γένους *Papaver* στην Κύπρο και δεν είναι αναγκαίο να διαχωρίζετε τα είδη για την καταμέτρηση. Ωστόσο, αν γνωρίζετε το είδος, παρακαλούμε να προσθέσετε τις πληροφορίες αυτές στο έντυπο καταγραφής.

Οι καταμετρήσεις των ανθέων πρέπει να βασίζονται στον αριθμό των μεμονωμένων ανθέων (όπως φαίνονται στον άσπρο κύκλο στην πιο πάνω φωτογραφία).

Μυοπόρο, Waterbush *Myoporum tenuifolium* (Ξενικό)

Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος
-------------	---------	----------





Ξενικό είδος στην Κύπρο. Ιθαγενές της Αυστραλίας. Χρησιμοποιείται ως φυτοφράχτης.

Οι καταμετρήσεις των ανθέων πρέπει να βασίζονται στον αριθμό μεμονωμένων ανθέων (όπως φαίνεται στον άσπρο κύκλο στις πιο πάνω φωτογραφίες). Όπου αναπτύσσεται ως ψηλός θάμνος ή με μορφή φυτοφράχτη, το τετράγωνο 50cm x 50cm μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα ή σε βολική γωνία στον θάμνο, αρκεί να καθορίζει σαφώς την περιοχή των ανθέων που θα χρησιμοποιήσετε για την καταμέτρησή σας.

Από τον Μάρτιο και μετά

Χωνάκι, Bindweed, *Convolvulus spp.*

Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος
---------	----------	-------	---------	---------





Φυτό με λευκά ή ρόδινα άνθη, διαδεδομένο σε χαμηλά υψόμετρα. Συναντάται σε αρόσιμα χωράφια, χλοώδεις πλαγιές και διαταραγμένες και εγκαταλειμμένες θέσεις.

Υπάρχουν πολλά είδη του γένους *Convolvulus* στην Κύπρο και δεν είναι αναγκαίο να τα αναγνωρίζετε για την καταμέτρηση. Ωστόσο, αν γνωρίζετε ποια είδη έχετε χρησιμοποιήσει, παρακαλούμε να προσθέσετε τις πληροφορίες αυτές στο έντυπο καταγραφής.

Οι καταμετρήσεις των ανθέων πρέπει να βασίζονται στον αριθμό των μεμονωμένων ανθέων (όπως φαίνεται στον άσπρο κύκλο στη φωτογραφία πιο πάνω).

Δέντρο του Ιούδα, Judas Tree, *Cercis siliquastrum* (Ξενικό)

Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος
----------------	-----------------	--------------



Ξενικό στην Κύπρο. Ιθαγενές στη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη δυτική Ασία. Φυτεύεται σε κήπους, πάρκα και φυτείες δρόμων σε όλες τις πόλεις και στην ύπαιθρο.

Οι καταμετρήσεις των ανθέων πρέπει να βασίζονται στον αριθμό μεμονωμένων ανθέων (όπως φαίνεται στον άσπρο κύκλο στην πιο πάνω φωτογραφία). Όπου αναπτύσσεται ως δέντρο, το τετράγωνο 50cm x 50cm μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα ή σε βολική γωνία στο δέντρο, αρκεί να καθορίζει σαφώς την περιοχή των ανθέων που θα χρησιμοποιήσετε για την καταμέτρησή σας.

Λεβάντα, Lavender, *Lavandula stoechas*

Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος
---------	----------	-------



© Lena Alexiou

Ένα γνώριμο ιθαγενές φυτό σε ξηρούς θαμνώνες, σε κήπους και πάρκα. Έχει μωβ άνθη με χαρακτηριστική μυρωδιά.

Οι καταμετρήσεις των ανθέων πρέπει να βασίζονται στον αριθμό των ταξιανθιών (όπως φαίνεται στον άσπρο κύκλο στην πιο πάνω φωτογραφία). Σε πυκνές συστάδες λεβάντας, ίσως παρατηρήσετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά άνθη να μετρήσετε. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να κάνετε έναν υπολογισμό, π.χ. μετρώντας τα άνθη στο ένα τέταρτο του τετραγώνου και πολλαπλασιάζοντας x4 για να βρείτε το σύνολο των ανθέων όλου του τετραγώνου.

Παθκιά του καμήλου, Μποχίνια, Camel's Foot, *Bauhinia variegata* (Ξενικό)

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος



Ξενικό στην Κύπρο. Ιθαγενές της Ινδίας. Χρησιμοποιείται σε φυτεύσεις παραπλεύρως των δρόμων.

Οι καταμετρήσεις των ανθέων πρέπει να βασίζονται στον αριθμό μεμονωμένων ανθέων (όπως φαίνεται στον άσπρο κύκλο στην πιο πάνω φωτογραφία). Όπου αναπτύσσεται ως ψηλό δέντρο, το τετράγωνο 50cm x 50cm μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα ή σε βολική γωνία στο δέντρο, αρκεί να καθορίζει σαφώς την περιοχή των ανθέων που θα χρησιμοποιήσετε για την καταμέτρησή σας.

Καλλιστήμων ο λογχοειδής, Bottlebrush, *Callistemon lanceolatus* (Ξενικό)

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος





Ξενικό στην Κύπρο, ιθαγενές της Αυστραλίας. Συναντάται συχνά σε πάρκα και κήπους.

Οι καταμετρήσεις των ανθέων πρέπει να βασίζονται στον αριθμό των ταξιανθιών (όπως φαίνεται στον άσπρο κύκλο στην πιο πάνω φωτογραφία). Όπου αναπτύσσεται ως ψηλός θάμνος ή με τη μορφή φυτοφράκτη, το τετράγωνο 50cm x 50cm μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα ή σε βολική γωνία στον θάμνο, αρκεί να καθορίζει σαφώς την περιοχή των ανθέων που θα χρησιμοποιήσετε για την καταμέτρησή σας.

Από τον Απρίλιο και μετά

Ιβίσκος, Chinese Hibiscus, *Hibiscus rosa sinensis*

Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγ.	Σεπτ.	Οκτ.	Νοέμβρ.	Δεκ.	Ιαν.
----------	-------	---------	---------	------	-------	------	---------	------	------





Ξενικό στην Κύπρο. Ιθαγενές στην Ασία. Συναντάται συχνά σε αστικές περιοχές και κήπους, πεζοδρόμια και πάρκα.

Οι καταμετρήσεις των ανθέων πρέπει να βασίζονται στον αριθμό των μεμονωμένων ανθέων (όπως φαίνεται στον άσπρο κύκλο στην πιο πάνω φωτογραφία). Όπου αναπτύσσεται ως ψηλός θάμνος ή με μορφή φυτοφράχτη, το τετράγωνο 50cm x 50cm μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα ή σε βολική γωνία στον θάμνο, αρκεί να καθορίζει σαφώς την περιοχή των ανθέων που θα χρησιμοποιήσετε για την καταμέτρησή σας.

Ηλιοτρόπιο, *Heliotropes*, *Heliotropium* spp.

Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος
----------	-------	---------	---------	-----------	-------------	-----------	-----------





Φυτό που συναντάται σε καλλιεργημένο έδαφος.


Υπάρχουν διάφορα ιθαγενή είδη του γένους *Heliotropium* στην Κύπρο και δεν είναι αναγκαίο να τα διαχωρίζετε για την καταμέτρηση. Ωστόσο, αν γνωρίζετε ποια είδη έχετε χρησιμοποιήσει, παρακαλούμε να προσθέσετε τις πληροφορίες αυτές στο έντυπο καταγραφής.

Οι καταμετρήσεις των ανθέων πρέπει να βασίζονται στον αριθμό των ταξιανθιών (όπως φαίνεται στον άσπρο κύκλο στις πιο πάνω φωτογραφίες).

Ρολογάκι, Common Passion Flower, *Passiflora caerulea* (Ξενικό)

Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος
----------	-------	---------	---------	-----------	-------------	-----------





Ξενικό στην Κύπρο, συναντάται παραπλεύρως των δρόμων και ως φυτοφράχτης.

Οι καταμετρήσεις των ανθέων πρέπει να βασίζονται στον αριθμό των μεμονωμένων ανθέων όπως φαίνεται στον άσπρο κύκλο στις πιο πάνω φωτογραφίες).

Αναθήκη, Fennel, *Foeniculum vulgare*

Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος
----------	-------	---------	---------	-----------	-------------





Ιθαγενές. Συναντάται σε πολλούς οικότοπους, σε χλωώδες, ανώμαλο ή διαταραγμένο έδαφος, ειδικότερα σε άκρες δρόμων και χωματόδρομων, σε θαμνώνες, όχθες ποταμών, σταθεροποιημένες αμμοθίνες, παράκτιες βραχώδεις εκτάσεις, ορεινή ποώδη βλάστηση και σε αδόμητη αστική γη.

Υπάρχουν πολλά παρόμοια φυτά της οικογένειας αυτής, αλλά το μεγάλο ύψος του φυτού, τα έντονα διαιρεμένα φύλλα και τα κίτρινα πέταλα βοηθούν ώστε να ξεχωρίζει η αναθρήκα από τους συγγενείς της.

Οι καταμετρήσεις των ανθέων πρέπει να βασίζονται στον αριθμό των σύνθετων σκιαδίων (ένα σύνθετο σκιαδίο φαίνεται στον άσπρο κύκλο πιο πάνω).

Μερσινιά, Myrtle, *Myrtus communis*

Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος
----------	-------	---------	---------	-----------





Ένα πολύ κοινό, ιθαγενές, θαμνώδες φυτό που φτάνει έως και τα 3 μέτρα και μεγαλώνει σε θαμνώνες αείφυλλων σκληρόφυλλων.

Οι καταμετρήσεις ανθέων πρέπει να βασίζονται στον αριθμό των μεμονωμένων ανθέων (όπως φαίνεται στον κύκλο στην πάνω δεξιά φωτογραφία). Όπου αναπτύσσεται ως ψηλός θάμνος ή με τη μορφή φυτοφράχτη, το τετράγωνο 50cm x 50cm μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα ή σε βολική γωνία στον θάμνο, αρκεί να καθορίζει σαφώς την περιοχή των ανθέων που θα χρησιμοποιήσετε για την καταμέτρησή σας.

Ελιά, Olive, *Olea europaea*

Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος
----------	-------	---------





© Marios Philippou

Ένα γνώριμο, ιθαγενές δέντρο που φύεται σε πετρώδεις πλαγιές, ελαιώνες, κήπους και πάρκα.

Οι καταμετρήσεις των ανθέων πρέπει να βασίζονται στον αριθμό των ανθέων (όπως φαίνεται στον κύκλο στην πιο πάνω φωτογραφία). Όπου αναπτύσσεται ως ψηλός θάμνος ή με τη μορφή φυτοφράχτη, το τετράγωνο 50cm x 50cm μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα ή σε βολική γωνία στον θάμνο, αρκεί να καθορίζει σαφώς την περιοχή των ανθέων που θα χρησιμοποιήσετε για την καταμέτρησή σας.

Γρεβιλλέα η ισχυρή, Silky Oak, *Grevillea robusta* (Ξενικό)

Απρίλιος

Μάιος





Ξενικό στην Κύπρο. Καλλιεργείται σε κήπους και πάρκα και είναι ιθαγενές της ανατολικής Αυστραλίας.

Οι καταμετρήσεις των ανθέων πρέπει να βασίζονται στον αριθμό των ταξιανθιών (όπως φαίνεται στον άσπρο κύκλο στην πιο πάνω φωτογραφία). Όπου αναπτύσσεται ως δέντρο, το τετράγωνο 50cm x 50cm μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα ή σε βολική γωνία στο δέντρο, αρκεί να καθορίζει σαφώς την περιοχή των ανθέων που θα χρησιμοποιήσετε για την καταμέτρησή σας.

Τζιακαράντα, Sharpleaf Jacaranda, *Jacaranda mimosifolia* (Ξενικό)

Απρίλιος	Μάιος
----------	-------





Ξενικό είδος στην Κύπρο. Ιθαγενές της Βραζιλίας. Συναντάται συχνά σε αστικές περιοχές, σε κήπους, πεζοδρόμια και πάρκα.

Οι καταμετρήσεις των ανθέων πρέπει να βασίζονται στον υπολογισμό του αριθμού των μεμονωμένων ανθέων (όπως φαίνεται στον άσπρο κύκλο στις πιο πάνω φωτογραφίες). Όπου αναπτύσσεται ως ψηλό δέντρο, το τετράγωνο 50cm x 50cm μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα ή σε βολική γωνία στο δέντρο, αρκεί να καθορίζει σαφώς την περιοχή των ανθέων που θα χρησιμοποιήσετε για την καταμέτρησή σας.

Από τον Μάιο και μετά

Πλουμπάγο η ωτοειδής, Blue Plumbago, *Plumbago auriculata* (Ξενικό)

Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος
-------	---------	---------	-----------	-------------	-----------	-----------



Ιθαγενές της Νοτίου Αφρικής. Φύεται συχνά σε πάρκα και κήπους.

Οι καταμετρήσεις των ανθέων πρέπει να βασίζονται στον αριθμό των ταξιανθιών (όπως φαίνεται στον άσπρο κύκλο στις πιο πάνω φωτογραφίες).

Αλμπίτσια, Silk Tree, *Albizia julibrissin*

Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος
-------	---------	---------	-----------	-------------



Ξενικό είδος στην Κύπρο. Ιθαγενές της Κίνας, Ιαπωνίας, νότιας Ρωσίας και βόρειου Ιράν. Φυτεύεται σε κήπους, πάρκα και κατά μήκος δρόμων σε αστικές περιοχές.

Οι καταμετρήσεις των ανθέων πρέπει να βασίζονται στον αριθμό των μεμονωμένων ανθέων (όπως φαίνεται στον άσπρο κύκλο στην πιο πάνω φωτογραφία). Όπου αναπτύσσεται ως ψηλό δέντρο, το τετράγωνο 50cm x 50cm μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα ή σε βολική γωνία στο δέντρο, αρκεί να καθορίζει σαφώς την περιοχή των ανθέων που θα χρησιμοποιήσετε για την καταμέτρησή σας.

Από τον Ιούνιο και μετά

Γιασεμί το μεγανθές, Spanish Jasmine, *Jasminum grandiflorum* (Ξενικό)

Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Ιανουάριος
---------	---------	-----------	-------------	-----------	-----------	------------	------------



Ξενικό είδος στην Κύπρο. Ιθαγενές της Νοτιοανατολικής Ασίας. Καλλιεργείται συχνά σε κήπους και πάρκα.

Οι καταμετρήσεις των ανθέων πρέπει να βασίζονται στον αριθμό των μεμονωμένων ανθέων (όπως φαίνεται στον άσπρο κύκλο στην πιο πάνω φωτογραφία).

Βουκεμβίλια, Γιαννής, Lesser Bougainvillea, *Bougainvillea glabra*

Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος
---------	---------	-----------	-------------	-----------	-----------



Ξενικό είδος στην Κύπρο. Ιθαγενές στη Βραζιλία. Συναντάται συχνά σε αστικές περιοχές, κήπους, πεζοδρόμια και πάρκα.


Οι καταμετρήσεις των ανθέων πρέπει να βασίζονται στον αριθμό των μεμονωμένων ανθέων (όπως φαίνεται στον άσπρο κύκλο στην πιο πάνω φωτογραφία). Όπου αναπτύσσεται ως ψηλός θάμνος ή με μορφή φυτοφράκτη, το τετράγωνο 50cm x 50cm μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα ή σε βολική γωνία στον θάμνο, αρκεί να καθορίζει σαφώς την περιοχή των ανθέων που θα χρησιμοποιήσετε για την καταμέτρησή σας.

Από τον Ιούλιο και μετά

Παρκινσόνια, Jerusalem Thorn, *Parkinsonia aculeata* (Ξενικό)

Ιούλιος

Αύγουστος



Ξενικό είδος στην Κύπρο. Ιθαγενές της Νοτίου Αμερικής. Εγκλιματισμένο στην Κύπρο, ιδιαίτερα σε άκρες δρόμων.

Οι καταμετρήσεις των ανθέων πρέπει να βασίζονται στον αριθμό των μεμονωμένων ανθέων (όπως φαίνεται στον άσπρο κύκλο στην πιο πάνω φωτογραφία). Όπου αναπτύσσεται ως ψηλό δέντρο, το τετράγωνο 50cm x 50cm μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα ή σε βολική γωνία στο δέντρο, αρκεί να καθορίζει σαφώς την περιοχή των ανθέων που θα χρησιμοποιήσετε για την καταμέτρησή σας.

Από τον Οκτώβριο και μετά

Βιγνόνια, Yellow Elder, *Tecoma stans* (Ξενικό)

Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Ιανουάριος
-----------	-----------	------------	------------



Ξενικό είδος στην Κύπρο. Ιθαγενές της Αμερικής και των Δυτικών Ινδιών. Στην Κύπρο καλλιεργείται σε κήπους και πάρκα.

Οι καταμετρήσεις των ανθέων πρέπει να βασίζονται στον αριθμό των μεμονωμένων ανθέων (όπως φαίνεται στον άσπρο κύκλο στην πιο πάνω φωτογραφία). Όπου αναπτύσσεται ως ψηλός θάμνος ή δέντρο, το τετράγωνο 50cm x 50cm μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα ή σε βολική γωνία στον θάμνο ή το δέντρο, αρκεί να καθορίζει σαφώς την περιοχή των ανθέων που θα χρησιμοποιήσετε για την καταμέτρησή σας.

Από τον Νοέμβριο και μετά

Ξινάκι, Bermuda buttercup, *Oxalis pes-caprae* (Ξενικό)

Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος
-----------	------------	------------	-------------	---------	----------	-------



Ξενικό είδος στην Κύπρο. Ιθαγενές της Νοτίου Αφρικής. Το ξινάκι συναντάται σε πολλούς οικότοπους, αλλά προτιμά διαταραγμένα εδάφη, όπως αρόσιμα χωράφια, καλλιέργειες, βοσκότοπους, ερείσματα δρόμων, χλοοτάπητες, χωματόδρομους, μονοπάτια και αδόμητο έδαφος.

Έχει πολύ χαρακτηριστικά άνθη κίτρινου χρώματος.

Οι καταμετρήσεις ανθέων πρέπει να βασίζονται στον αριθμό των μεμονωμένων ανθέων (όπως φαίνεται στον άσπρο κύκλο στην πιο πάνω φωτογραφία).

Εναλλακτικές επιλογές ανθέων κατάλληλα για τις παρατηρήσεις σας

Αν δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο από τα άνθη-στόχους που αναφέρονται πιο πάνω, μπορείτε να επιλέξετε κάποιο άλλο άνθος που προσελκύει έντομα στην περιοχή σας. Στον πίνακα που ακολουθεί προτείνονται ορισμένα επιπρόσθετα είδη, που είναι γνωστό ότι προσελκύουν επικονιαστές, αλλά αν το επιθυμείτε μπορείτε να πραγματοποιήσετε την παρατήρηση σας σε οποιοδήποτε ανθοφόρο φυτό. Παρακαλούμε ενημερώστε μας σε ποια είδη πραγματοποιήσατε την παρατήρηση σας, όταν θα προσθέσετε τα αποτελέσματά σας στο [ηλεκτρονικό](#) έντυπο καταγραφής.

Για ορισμένα από αυτά τα είδη, προσφέρονται συμβουλές ταυτοποίησης στον [Οδηγό Ταυτοποίησης Ειδών](#) του Εθνικού Προγράμματος Παρακολούθησης Φυτών του ΗΒ ή το Flora of Cyprus (<http://www.flora-of-cyprus.eu/>). Παρόλο που κάποια από τα είδη στον Οδηγό ίσως δεν υπάρχουν στην Κύπρο, μπορεί να υπάρχουν συγγενικά είδη που να βοηθήσουν με την ταυτοποίηση.

Κοινή Ονομασία	Λατινικό όνομα	Καθεστώς	Άνθηση από	Άνθηση μέχρι
	<i>Lecokia cretica</i>	Ιθαγενές	Ιανουάριος	Απρίλιος
	<i>Linaria chalepensis</i>	Ιθαγενές	Ιανουάριος	Μάιος
	<i>Prasium majus</i>	Ιθαγενές	Ιανουάριος	Μάιος
White willow	<i>Salix alba</i>	Ιθαγενές	Φεβρουάριος	Μάρτιος
Almond	<i>Prunus dulcis</i>	Ιθαγενές	Φεβρουάριος	Μάρτιος
	<i>Tordylium spp.</i>	Ιθαγενές	Φεβρουάριος	Απρίλιος
	<i>Geranium tuberosum</i>	Ιθαγενές	Φεβρουάριος	Απρίλιος
	<i>Micromeria nervosa</i>	Ιθαγενές	Φεβρουάριος	Απρίλιος
	<i>Lithodora hispidula</i>	Ιθαγενές	Φεβρουάριος	Μάιος
	<i>Lomelosia prolifera</i>	Ιθαγενές	Φεβρουάριος	Μάιος
	<i>Onobrychis venosa</i>	Ιθαγενές (Ενδημικό)	Φεβρουάριος	Μάιος
Sow-thistles	<i>Sonchus spp.</i>	Ιθαγενές	Φεβρουάριος	Οκτώβριος
	<i>Lotus spp.</i>	Ιθαγενές	Φεβρουάριος	Σεπτέμβριος
Pear	<i>Pyrus syriaca</i>	Ιθαγενές	Μάρτιος	Μάρτιος
	<i>Malva cretica</i>	Ιθαγενές	Μάρτιος	Μάρτιος
Borage	<i>Borago officinalis</i>	Ιθαγενές	Μάρτιος	Απρίλιος
Azarole	<i>Crataegus azarolus</i>	Ιθαγενές	Μάρτιος	Απρίλιος
	<i>Trifolium spumosum</i>	Ιθαγενές	Μάρτιος	Απρίλιος
Italian Alkanet	<i>Anchusa azurea</i>	Ιθαγενές	Μάρτιος	Μάιος
	<i>Bellardia trixago</i>	Ιθαγενές	Μάρτιος	Μάιος
Thistle	<i>Carduus sp.</i>	Ιθαγενές	Μάρτιος	Μάιος
	<i>Onosma fruticosum</i>	Ιθαγενές (Ενδημικό)	Μάρτιος	Μάιος
	<i>Phagnalon rupestre</i>	Ιθαγενές	Μάρτιος	Μάιος
Plum	<i>Prunus avium</i>	Ξενικό (Εγκλιματισμένο)	Μάρτιος	Μάιος
	<i>Anthemis pseudocotula</i>	Ιθαγενές	Μάρτιος	Ιούλιος

Narrow-leaved viper's bugloss	<i>Echium angustifolium</i>	Ιθαγενές	Μάρτιος	Ιούλιος
	<i>Erica sicula</i>	Ιθαγενές	Μάρτιος	Ιούλιος
	<i>Centaurea aegialophila</i>	Ιθαγενές	Μάρτιος	Αύγουστος
	<i>Centaurea aegialophila</i>	Ιθαγενές	Μάρτιος	Αύγουστος
Tassel Hyacinth	<i>Muscari comosum</i>	Ιθαγενές	Μάρτιος	Αύγουστος
	<i>Misopates orontium</i>	Ιθαγενές	Μάρτιος	Ιούλιος
	<i>Campanula erinus</i>	Ιθαγενές	Απρίλιος	Μάιος
	<i>Centaurea hyalolepis</i>	Ιθαγενές	Απρίλιος	Ιούλιος
Cotton-thistle	<i>Onopordum cyprium</i>	Ιθαγενές (Ενδημικό)	Απρίλιος	Ιούλιος
	<i>Stachys cretica</i>	Ιθαγενές	Απρίλιος	Ιούλιος
	<i>Ajuga iva</i>	Ιθαγενές	Απρίλιος	Αύγουστος
	<i>Polygonum equisetiforme</i>	Ιθαγενές	Απρίλιος	Οκτώβριος
Carrot	<i>Daucus carota subsp. maximus</i>	Ιθαγενές	Απρίλιος	Σεπτέμβριος
	<i>Thymus capitatus</i>	Ιθαγενές	Μάιος	Οκτώβριος
Yarrow	<i>Achillea millefolium</i>	Ξενικό	Ιούνιος	Αύγουστος
Globe-thistle	<i>Echinops spinosissimus</i>	Ιθαγενές	Ιούλιος	Οκτώβριος
	<i>Echinops spinosissimus</i>	Ιθαγενές	Ιούλιος	Οκτώβριος
	<i>Pteroccephalus multiflorus</i>	Ιθαγενές (Ενδημικό)	Ιούλιος	Νοέμβριος
Stink Aster	<i>Dittrichia viscosa</i>	Ιθαγενές	Αύγουστος	Νοέμβριος
	<i>Veronica cymbalaria</i>	Ιθαγενές	Νοέμβριος	Ιούνιος
	<i>Crepis sancta</i>	Ιθαγενές	Δεκέμβριος	Απρίλιος
Henbit Deadnettle	<i>Lamium amplexicaule</i>	Ιθαγενές	Δεκέμβριος	Μάιος

ΕΡΕΥΗΤΗΡΙΟ ΑΝΘΕΩΝ ΣΤΟΧΩΝ- INDEX TARGET FLOWERS					
Latin name	Σελίδα	Κοινή Ελληνική Ονομασία	Σελίδα	Common English Name	Page
<i>Acacia saligna</i>	14	Ακακία	14	Anemone	9
<i>Albizia julibrissin</i>	32	Αλμπίτσια	32	Blue Plumbago	31
<i>Convolvulus spp.</i>	18	Αναθρήκα	26	Bottlebrush	22
<i>Grevillea robusta</i>	29	Ανεμώνη	9	Common Winter-Cherry	7
<i>Jacaranda mimosifolia</i>	30	Ασπάλαθος	11	Fennel	26
<i>Jasminum grandiflorum</i>	33	Βιγνόνια	36	Hopseed-Bush	10
<i>Olea europaea</i>	28	Βουκεμβίλια, Γιαννής	34	Lavender	20
<i>Papaver spp.</i>	16	Γιασεμί το μεγανθές	33	Lesser Bougainvillea	34
<i>Passiflora caerulea</i>	25	Γιατρός	6	Myrtle	27
<i>Sinapis alba</i>	15	Γρεβιλλέα	29	Poppies	16
<i>Tecoma stans</i>	36	Δέντρο του Ιούδα	19	Rock-roses	8
<i>Withania somnifera</i>	7	Δωδόνεια	10	Silk Tree	32
<i>Anemone coronaria</i>	9	Ελιά	28	Waterbush Myoporum	17
<i>Bauhinia variegata</i>	21	Ηλιοτρόπιο	24	Acacia	14
<i>Bougainvillea glabra</i>	34	Καλλιστήμων ο λογχοειδής	22	African Boxthorn	5
<i>Calicotome villosa</i>	11	Κίτρινο γιασεμί	12	Bermuda buttercup	37
<i>Callistemon lanceolatus</i>	22	Λαντάνα η καμάρα	13	Bindweed	18
<i>Cercis siliquastrum</i>	19	Λαψάνα	15	Camel's Foot	21
<i>Cistus spp.</i>	8	Λεβάντα	20	Chrysanthemum	4
<i>Dodonaea viscosa</i>	10	Μερσινιά	27	Common Lantana	13
<i>Foeniculum vulgare</i>	26	Μερτζανιά	7	Common Passion Flower	25
<i>Glebionis coronarium</i>	4	Μυοπόρο	17	Heliotropes	24
<i>Heliotropium spp.</i>	24	Ξινάκι	37	Jerusalem Thorn	35
<i>Jasminum mesnyi</i>	12	Ξισταριές	8	Judas Tree	19
<i>Lantana camara</i>	13	Παθκιά του καμήλου	21	Olive	28
<i>Lavandula stoechas</i>	20	Παπαρούνες	16	Primrose Jasmine	12
<i>Lycium ferocissimum</i>	5	Παρκινσόνια	35	Sharpleaf Jacaranda	30
<i>Myoporum tenuifolium</i>	17	Πλουμπάγο	31	Silky Oak	29
<i>Myrtus communis</i>	27	Ρολογάκι	25	Spanish Jasmine	33

<i>Nicotiana glauca</i>	6	Τζιακαράντα	30	Spiny Broom	11
<i>Oxalis pes-caprae</i>	37	Φραμός Αρκοτομαθικιά	5	Tree Tobacco	6
<i>Parkinsonia aculeata</i>	35	Χρυσάνθεμο	4	White Mustard	15
<i>Plumbago auriculata</i>	31	Χωνάκι	18	Yellow Elder	36